

DR. MILES' Aspir-Mint

A Pleasant, Effective, Modern Formula

For Coryza (simple cold in the head) ; Ordinary Neuralgia and Headache; Muscular Pains and Functional Pains. Better than any of its single constituents.

Dr. Miles' Aspir-Mint is a pleasant mint-flavored tablet of Acetyl-Salicylic Acid, (Aspirin) Phenacetin and Caffeine.

Acetyl-Salicylic Acid (Aspirin) is a generally used medicine of known value.

Phenacetin is a reliable analgesic (pain relieving) medicine.

Caffeine, as used, is a mild stimulant to the respiratory, cerebral, and spinal centers.

A combination of these medicines as found in Dr. Miles' Aspir-Mint, gives the prompt effect of Phenacetin with the later effect of Acetyl-Salicylic Acid (Aspirin).

The range of use of Aspir-Mint is much wider than that of Phenacetin alone. The addition of Phenacetin makes the pain-relieving properties of the Aspir-Mint quicker and more certain.

General Directions For Taking Dr. Miles' Aspir-Mint

One or two tablets repeated in an hour. Continue, if necessary, until eight have been taken in twenty-four hours.

For Coryza (simple cold in the head); one or two tablets. Repeat in two hours, then one or two tablets three times a day until relieved of the distress. If necessary this can be continued for several days.

As a Gargle; dissolve two tablets in one-third glass of water and use as a gargle. Let a small amount of the water trickle down throat. Repeat in an hour if discomfort continues. If preferred, dissolve one tablet on tongue. Let saliva trickle slowly down the throat. Repeat in an hour. Continue if necessary, until eight have been used in twenty-four hours.

Samples for your friends FREE

Write on the blank below names of friends to whom you would like samples sent. We will gladly send these samples free with your compliments.

Name

Address

Name

Address

Your Name

Address

Dr. Miles Medical Company, Elkhart, Indiana

Allgemeine Anweisungen zum Gebrauch von Dr. Miles' "Aspir-Mint"

Jede Tablette enthält 1½ gran Phenacetin. (Acetanilid Produkt)

Eine bis zwei Tabletten, nach einer Stunde zu wiederholen. Wenn nötig bis zu acht Pillen innerhalb vierundzwanzig Stunden.

Gegen Coryza (einfachen Schnupfen), eine bis zwei Tabletten; nach zwei Stunden zu wiederholen, dann eine oder zwei Tabletten dreimal täglich bis die Erkältung nachgelassen hat. Wenn nötig, kann man dies mehrere Tage hindurch fortsetzen.

Zum Gurgeln—Man löse zwei Tabletten in ein Drittel Glas Wasser auf und benutze es zum Gurgeln. Man lasse eine geringe Menge Wasser den Schlund hinunterlaufen Wenn nötig in einer Stunde zu wiederholen. (German)

Instrucciones Generales para Tomar el Aspir-Mint del Dr. Miles

Cada tableta contiene 1½ granos Phenacetin (Acetanilid derivados)

Una o dos pastillas repetidas en una hora. Si es necesario, se continúa hasta tomar ocho dentro de un período de 24 horas.

Para coriza (simple resfrió a la cabeza), una o dos pastillas. Se repite en dos horas y se sigue después tomando una o dos pastillas tres veces al día tomando hasta alivarse. Si fuere necesario podrá continuarse esto por varios días.

PARA GARGARAS—Se disuelven dos pastillas en la tercera parte de un vaso de agua y se hace gárgaras. Déjese que un poquito del agua haga cosquillo en la garganta. Si no hay alivio, repítase esto después de una hora. (Spanish)

Istruzioni Generali per Prendere L'Aspir-Mint del Dott. Miles

Fenacetina 1½ grani per pastiglia (Derivativo d'acetanilide)

Una o due pastiglie ripetute entro un'ora. Continuare, se necessario, fino a che se ne saranno prese otto in ventiquattro ore.

Per la corizza (semplice raffreddore di testa)—una o due pastiglie. Ripetere entro due ore, quindi una o due pastiglie tre volte al giorno fino che si ottenga sollievo. Se necessario, ciò può continuarsi per parecchi giorni. Come gargarismo—sciolgere due pastiglie in un terzo di bicchiere d'acqua ed usare come gargarismo. Lasciar discendere un pò d'acqua giù per la gola. Ripetere entro un'ora se non si ottiene sollievo. (Italian)

Renseignements Généraux sur le mode D'Emploi de "L'Aspir-Mint" du Dr. Miles

Phenacétine 1½ grains par tablette (Dérivatif d'Acéetanilide)

Une ou deux pastilles et recommencer au bout d'une heure. Continuer si c'est nécessaire jusqu'à ce qu'on en ait pris huit en vingt-quatre heures.

Pour le coryza (simple rhume (le cerveau)—d'une à deux pastilles. Recommencer au bout de deux heures, puis une ou deux pastilles trois fois par jour jusqu'à soulagement complet. Si c'est nécessaire, ce traitement peut être continué pendant plusieurs jours.

Comme gargarisme—Faire dissoudre deux pastilles dans un tiers de verre d'eau et s'en gargariser. Laisser un peu d'eau couler dans la gorge. Recommencer au bout d'une heure si le soulagement n'est pas complet. (French)

Allmänna Bruksanvisningar för Dr. Miles' Aspir-Mint

Fenacetin 1½ grain per tablett. (Acetanilid derivat)

En eller två tabletter, upprepa efter en timme. Fortsätt, ifall behöfvigt, tills åtta hava intagits inom tjugofyra timmar.

För coryza (vanlig snuva)—en eller två tabletter. Upprepa efter två timmar, därefter en eller två tabletter tre gånger dagligen, tills lindring inträffat. Detta kan man hålla på med i åtskilliga dagar, ifall behöfvigt.

För gurgling—upplös två tabletter i ett tredjedels glas vatten och bruka som gurgelvattnen. Låt lite gå ned i halsen. Upprepa efter en timme, ifall lindring icke inträffat. (Swedish)

Almindelige Regler for Bruken av Dr. Miles' Aspir-Mint

Phenacetin en og en halv grain pr. tablett. (Acetanilid afledning)

En eller to tabletter, gentagtt om en time. Fortsett hermed om det er nødvendigt, indtil man har tatt otte i døgn.

For "coryza" (almindelig forkjølelse) ta en eller to tabletter. Gjenta dette to timer efter, derpå en eller to tabletter tre ganger om dagen indtil lindring inntræder. Om nødvendigt kan dette fortsettes i flere dager. Som gurglevann—opløs to tabletter i et tredjedels glass vann og bruk som gurglevann. La litt av vannet renne ned i halsen. Gjenta efter en times forløp, hvis lindring ikke er inntrådt. (Norwegian)

Ogólne Przepisy Dotyczące Użytku "Dr. Miles' Aspir-Mint" Lekarswa na Zaziębienie

Phenacetin 1 i ½ granów w tablecie. (Rodowód Acetanilid)

Zażyć należy jedną lub dwie tabletki i powtórzyć to za godzinę. O ile okaże się koniecznem, zażywać dalsze tabletki, zaprzeczając po zażyciu ósmiej tabletki w przeciągu 24 godzin.

Jako lekarstwo na zwykłe kataralne zaziębienie głowy jedną lub dwie tabletki, powtarzając za dwie godziny. Następnie jedną lub dwie tabletki trzy razy dziennie aż zaziębienie ustąpi. O ile konieczność tego wymaga powtarzać to można przez kilka dni.

Jako środek do płukania gardła. Rozpuścić dwie tabletki w jednej trzeciej szklanki wody. Niech kilka kropli spłyną przez gardło. O ile nie skutkowało powtórzyć za godzinę. (Polish)

